

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 07.06.2024 08:41:27

Уникальный программный ключ:

e7a66f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bdfcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Клиническая патофизиология, СЕМЕСТР 7

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Патофизиологии и общей патологии
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите один правильный ответ 1. КЛИНИЧЕСКАЯ ТРИАДА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯ НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ССВО	1) тахикардия, тахипноэ, гипертония; 2) тахикардия, тахипноэ, гипертермия; 3) брадикардия, гипотония, гипотермия. 4) гипертония, судоржный синдром, аритмия; 5) брадипноэ, гипертермия, клонические судороги	низкий
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите один правильный ответ 2. ГЛАВНЫМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА РДСВ ЯВЛЯЕТСЯ	1) увеличение гидростатического давления в микрососудах стенки альвеол 2) уменьшение гидростатического давления в микрососудах стенки альвеол 3) значительное повышение уровня артериального давления 4) генерализованное повреждение капилляров легких и альвеолоцитов 5) интерстициальный отек легких 6) кардиогенный отек легких 7) развитие гиалиноза стенки альвеол	низкий
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите один правильный ответ 3. В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ПОСЛЕ МАССИВНОЙ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ РАЗВИВАЕТСЯ ГИПОКСИЯ	1) гемического типа 2) циркуляторного типа 3) тканевого типа 4) респираторного типа	низкий
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите один правильный ответ 4. У БОЛЬНОГО С БИЛИАРНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПОЯВИЛАСЬ СОНЛИВОСТЬ, УСИЛИЛАСЬ ЖЕЛТУХА, УМЕНЬШИЛАСЬ В РАЗМЕРАХ ПЕЧЕНЬ, ИЗОРТА ПОЯВИЛСЯ СЛАДКОВАТЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ЗАПАХ, ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ -	1) холестаза 2) печеночная кома 3) желудочно-кишечное кровотечение 4) портальная гипертензия	низкий

	ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ДЫХАНИЕ КУССМАУЛЯ. КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РАЗВИЛОСЬ У БОЛЬНОГО		
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите один правильный ответ 5. ВЕРНО ТО, ЧТО	1) кома всегда развивается постепенно, последовательно проходя несколько стадий расстройств сознания 2) кома может развиваться «молниеносно», без выраженной стадийности	низкий
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите все правильные ответы 6. С НАИБОЛЬШЕЙ ЧАСТОТОЙ СЕПСИС ВОЗНИКАЕТ У БОЛЬНЫХ	1) с нормоэргической реактивностью на фоне заражения особо опасными инфекциями; 2) с повышенной реактивностью и склонностью к локализации инфекции; 3) с гипоэргическими реакциями на фоне пульс-терапии гомонами; 4) со сниженной реактивностью и резистентностью на фоне повторного применения разных антибактериальных средств; 5) с гиперэргическими реакциями и дополнительным суперинфицированием	средний
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите все правильные ответы 7. ОСТРЫЙ РДС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ	1) Распространенным повреждением эндотелия легочных капилляров 2) Распространенным повреждением альвеолярного эпителия 3) Развитием некардиогенного отека легких 4) Кардиогенным отеком легких 5) Повышением артериального давления	средний
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите все правильные ответы 8. НАЗОВИТЕ ОБЩИЕ СИМПТОМЫ КРОВОПОТЕРИ	1) падение АД; 2) тахикардия; 3) бледность кожных покровов; 4) увеличение показателей гематокрита; 5) уменьшение содержания гемоглобина; 6) потеря сознания	средний
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите все правильные ответы 9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ДВС-СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ	1) травматично выполненные обширные хирургические операции 2) синдром «длительного раздавливания» 3) тяжёлая акушерская патология 4) уремия 5) авитаминоз К 6) сепсис 7) шок 8) гемофилия В 9) острые лейкозы	средний
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите все правильные ответы 10. ДВС-СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ	1) тромбоцитопенией 2) гипофибриногенемией 3) низким уровнем продуктов фибринолиза 4) повышенным уровнем антитромбина III 5) снижением содержания плазминогена 6) низким содержанием факторов II, V, VIII 7) повышенным уровнем D димеров 8) гемоглобинемией	средний
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1	Укажите все правильные ответы 11. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ	1) спазм мышц ЖКТ, вызывающий приступообразные боли в области живота 2) спазм ГМК мелких бронхов, вызывающий приступ удушья 3) отёк слизистых оболочек вследствие повышения проницаемости сосудистых	средний

		<p>стенки</p> <p>4) резкое падение системного АД</p> <p>5) тахикардия</p> <p>6) повышение содержания факторов комплемента в крови</p>	
<p>ОПК-5.6</p> <p>ОПК-5.8</p> <p>ОПК-5.9</p> <p>ОПК-5.10</p> <p>ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1</p>	<p>Укажите все правильные ответы</p> <p>12. СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ</p>	<p>1) понижением АД</p> <p>2) повышением АД</p> <p>3) понижением минутного объема сердца</p> <p>4) повышением минутного объема сердца</p> <p>5) повышением ОПСС</p> <p>6) понижением ОПСС</p>	<p>средний</p>
<p>ОПК-5.6</p> <p>ОПК-5.8</p> <p>ОПК-5.9</p> <p>ОПК-5.10</p> <p>ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1</p>	<p>Укажите все правильные ответы</p> <p>13. ДЛЯ КОМЫ ХАРАКТЕРНЫ</p>	<p>1) активация симпатикоадреналовой системы</p> <p>2) недостаточность функций органов</p> <p>3) активация функций органов</p> <p>4) состояние нервно психического возбуждения</p> <p>5) заторможенность пациента</p> <p>6) потеря сознания</p> <p>7) гипорефлексия, арефлексия</p> <p>8) гиперрефлексия</p>	<p>средний</p>
<p>ОПК-5.6</p> <p>ОПК-5.8</p> <p>ОПК-5.9</p> <p>ОПК-5.10</p> <p>ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1</p>	<p>Укажите все правильные ответы</p> <p>14. ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ</p>	<p>1) процента насыщения трансферрина</p> <p>2) уровня сывороточного железа</p> <p>3) уровня ферритина в сыворотке</p> <p>4) концентрации гемоглобина в эритроците</p> <p>5) железосвязывающей способности сыворотки крови</p>	<p>средний</p>
<p>ОПК-5.6</p> <p>ОПК-5.8</p> <p>ОПК-5.9</p> <p>ОПК-5.10</p> <p>ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1</p>	<p>Укажите все правильные ответы</p> <p>15. РАЗВИТИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ</p>	<p>1) экссудативном плеврите</p> <p>2) бронхиальной астме</p> <p>3) силикозе</p> <p>4) перегревании организма</p> <p>5) опухоли лёгкого</p> <p>6) приступе истерии</p> <p>7) массивной кровопотере</p>	<p>средний</p>
<p>ОПК-5.6</p> <p>ОПК-5.8</p> <p>ОПК-5.9</p> <p>ОПК-5.10</p> <p>ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-10.1</p>	<p>Выберите комбинацию ответов</p> <p>16. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ КРОВОТЕЧЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ К НАРУЖНЫМ СКРЫТЫМ</p> <p>1) КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ</p> <p>2) МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ</p> <p>3) КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ В БРЮШНУЮ И ГРУДНУЮ ПОЛОСТИ</p> <p>4) ПОЧЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ</p> <p>5) ГЕМАТОМА МЯГКИХ ТКАНЕЙ</p> <p>6) ГЕМАРТРОЗЫ</p> <p>7) КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ</p> <p>8) ВТОРИЧНЫЕ РАННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ УШИТЫХ</p>	<p>а) 1,2,7,8</p> <p>б) 1,2,4,7</p> <p>в) 2,3,6,7</p> <p>г) 3,6,7,8</p> <p>д) 2,5,6,8</p>	<p>высокий</p>

	ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН		
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК- 9.2 ПК-10.1	Укажите все правильные ответы 17. НАРУШЕНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ	1) цирроза печени 2) тромбоцитопатии 3) гемофилии 4) геморрагического васкулита 5) тромботической тромбоцитопенической пурпуры 6) болезни фон Виллебранда 7) дефицита витамина В12 8) лейкозов	ВЫСОКИЙ
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК- 9.2 ПК-10.1	Закончите предложение 18. ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ЭТО		ВЫСОКИЙ
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК- 9.2 ПК-10.1	Выберите правильную комбинацию ответов 19. СФОРМИРУЙТЕ «ПОРОЧНЫЙ» КРУГ ИЗ ЗВЕНЬЕВ ПАТОГЕНЕЗА РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС– СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ А) ГИПОВЕНТИЛЯЦИЯ В) НЕДОНОШЕННОСТЬ С) АТЕЛЕКТАЗ D) СНИЖЕНИЕ СИНТЕЗА СУРФАКТАНТА Е) ГИПОКСЕМИЯ, ГИПЕРКАПНИЯ	1) В,D,E,C,A 2) A,E,C,D,B 3) B,D,C,A,E 4) A,B,C,D,E	ВЫСОКИЙ
ОПК-5.6 ОПК-5.8 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ПК-9.1 ПК- 9.2 ПК-10.1	Закончите предложение 20. КРОВОТЕЧЕНИЕ – ЭТО ИЗЛИЯНИЕ КРОВИ В		ВЫСОКИЙ